МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА № 16 / 2026
Исх. №-1-8/2703 от 05.10.2026 г.

107078, Москва, ул. Садовая - Спасская, д. 11/1
тел/факс: (495) 661-09-91, 280-03-02, e-mail: rscenter@rscagro.ru, http//: rosselhoscenter.ru

Оперативная информация о результатах обследования осеннего зимующего запаса саранчовых вредителей в Российской Федерации в 2026 г

Саранчовые вредители – многоядные вредители отряда Прямокрылые. Для ряда видов характерно образование стадных форм, сопровождающееся повышением миграционной активности и формированием крупных скоплений. Высокая численность и подвижность саранчовых обусловливают их способность в короткие сроки заселять значительные площади и интенсивно повреждать сельскохозяйственные культуры, что определяет их как одну из наиболее значимых групп многоядных вредителей. Наиболее опасны на территории Российской Федерации три стадных вида: итальянский прус, азиатская (перелетная) саранча, мароккская саранча.

Для оценки кубышек саранчовых вредителей на территории Российской Федерации проводятся осенние фитосанитарные обследования, направленные на выявление участков с высокой плотностью яйцекладок. При установлении участков с высокой численностью зимующего запаса рекомендуется проведение комплекса агротехнических мероприятий, направленных на механическое разрушение яйцекладок, ухудшение условий перезимовки и снижение жизнеспособности яиц, что способствует сокращению численности вредителя. К основным агротехническим приемам относятся глубокая вспашка с оборотом пласта, лущение, дискование, культивация и боронование.

Фитомониторинг саранчовых вредителей на наличие зимующего запаса стадных видов специалистами филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» проведён на площади 417,39 тыс. га, заселено кубышками 43,76 тыс. га. Обследования на наличие зимующего запаса нестадных видов саранчовых проведен на площади 464,16 тыс. га, кубышки выявлены на площади 109,01 тыс. га.

Мониторинг зимующего запаса стадных видов саранчовых вредителей в Российской Федерации выявил заселение кубышками преимущественно в Северо-Кавказском, Сибирском и Южном федеральных округах. Наибольшие площади заселения кубышками нестадных видов фиксировалось в Сибирском федеральном округе.

В Центральном федеральном округе обследования по зимующему запасу стадных саранчовых проведены на площади 14,71 тыс. га, кубышки были обнаружены на площади 0,15 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,2 экз./м^2. Зимующий запас нестадных видов обследовался на площади 14,67 тыс. га, кубышки отмечались на площади 0,004 тыс. га со средневзвешенной численностью 1 экз./м^2.

В Южном федеральном округе обследования по осеннему зимующему запасу стадных видов проведены на площади 134,00 тыс. га, кубышки отмечались на 12,04 тыс. га с численностью 1,2 экз./м^2. Зимующий запас нестадных видов обследовался на площади 10,71 тыс. га, кубышки отмечались на площади 2,65 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,30 экз./м^2.

В Северо-Кавказском федеральном округе фитомониторинг зимующего запаса стадных видов проведен на площади 109,63 тыс. га, кубышки выявлена на площади 17,37 тыс. га с численностью 0,8 экз./м^2. Зимующий запас нестадных видов обследовался на площади 0,99 тыс. га, кубышки отмечались на площади 0,53 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,53 экз./м^2.

В Приволжском федеральном округе обследования по зимующему запасу стадных саранчовых проведены на площади 35,13 тыс. га, кубышки выявлены на площади 0,86 тыс. га с численностью 0,27 экз./м^2. Обследования на наличие кубышек нестадных видов проводились на площади 42,43 тыс. га, заселение отмечалось на 8,73 тыс. га с численностью 0,62 экз./м^2.

В Уральском федеральном округе фитомониторинг осеннего зимующего запаса нестадных видов саранчовых проводился на площади 20,81 тыс. га, кубышки отмечались на площади 0,93 тыс. га с численностью 0,40 экз./м^2.

В Сибирском федеральном округе обследования по зимующему запасу стадных саранчовых проведены на площади 116,35 тыс. га, заселение фиксировалось на 13,35 тыс. га с численностью 0,33 экз./м^2. Фитомониторинг осеннего зимующего запаса нестадных видов был проведен на площади 288,20 тыс. га, кубышки выявлены на площади 83,83 тыс. га с численностью 2,1 экз./м^2.

В Дальневосточном федеральном округе фитосанитарный мониторинг зимующего запаса нестадных саранчовых вредителей проводился на площади 86,35 тыс. га, заселение было выявлено на площади 12,34 тыс. га с численностью 1,5 экз./м^2.

Фитосанитарный мониторинг осеннего зимующего запаса саранчовых вредителей продолжается. По его результатам в дальнейшем будет составлен прогноз фитосанитарной обстановки в 2027 году.

Информационный канал учреждения в мессенджере MAX:
«Россельхозцентр – Аграрные новости»
Присоединяйтесь по QR-коду