МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБУ «Россельхозцентр»
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

№ 45 от 27 июля 2026 г

Адрес: 625043, г. Тюмень, ул. Сеченова д.8, Тел. (3452) 553-553, mail: rsctyumen@mail.ru

Исх. № 410 от 27 июля 2026 г

Альтернариоз колоса или чернь колоса



Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области сообщает, что в третьей декаде июля при проведении фитосанитарного мониторинга на посевах озимых и яровых зерновых было отмечено проявление и распространение альтернариоза колоса.

При наступлении благоприятных погодных условий для распространения и развития инфекций (теплая, ветреная погода с температурой воздуха +23..+25°С и относительная влажность 60-95 %) на посевах сельскохозяйственных культур возможно быстрое массовое распространение заболевания.

Источником инфекции чаще всего служит зараженный семенной материал, не протравленный перед посевом, падалица сорных злаковых растений, пожнивные остатки. Данное заболевание начинает проявляться в фазу цветения - молочной спелости. Альтернариоз колоса вызывает потери урожая явные - в виде разрушения колоса, и скрытые - в виде понижения всхожести семян.

В период дозревания, особенно в влажные годы на стеблях, колосьях, зернах и стареющих листьях образуется оливково-черный бархатистый налет конидиального спороношения. ЭПВ в фазу колошения-молочной спелости – 20% развития заболевания.

В случае обнаружения первых симптомов заболеваний рекомендуем сельхозтоваропроизводителям провести фунгицидные обработки, в более поздние сроки применение фунгицидов менее эффективно и затруднено из-за соблюдение регламентов применения пестицидов, существует вероятность превышения остаточных количеств пестицидов зерне. Обработки препаратами необходимо проводить согласно «Реестра пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ в 2026 г.», проводить защитные мероприятия строго в соответствии с гигиеническими требованиями СП 2.2.3670-20 и СанПиН 1.2.3685-21, соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.

Рекомендуем сельскохозяйственным товаропроизводителям так же использовать здоровый семенной материал. Необходимо соблюдение пространственной изоляции семенных и товарных посевов (не менее 1 км), проведение сева в оптимальные агротехнические сроки и использование устойчивых сортов.