МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБУ «Россельхозцентр»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК № 38 /2026
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Брянской области
Исх.№ 1453 от 03.11.2026

241520, Брянская область, Брянский район, пос. Супонево, ул. Шоссейная, д. 11
тел./факс (4832) 41-07-37, 92-12-31 E-mail: 32@rscagro.ru

Зимующий запас хлопковой совки на территории Брянской области

Специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Брянской области проведено осеннее обследование зимующего запаса хлопковой совки на территории 1,838 тыс.га (в однократном исчислении), из них заселено 0,45 тыс.га.

Хлопковая совка (лат. Helicoverpa armigera) зимует в почве на глубине 10–15 см. На выживании куколок отрицательно сказываются резкие колебания температуры, оттепели и заморозки при повышенной влажности, промерзание почвы при отсутствии снежного покрова.

Для успешного формирования зимующего запаса совки необходимы благоприятные погодные условия: для завершения развития гусениц необходима сумма накопленных эффективных температур 300°С.

Основные меры борьбы проводят в период вегетации:

- *Агротехнические меры* — соблюдение севооборота, глубокая вспашка, удаление пожнивных остатков. Так как гусеницы совки окукливаются в верхних слоях почвы, глубокая зяблевая вспашка уничтожает значительную часть куколок.
- *Инсектицидные обработки*.
- *Биологические меры* — выпуск насекомых-паразитов (энтомофагов вредителей), например, трихограммы и габробракона.
- *Использование феромонных ловушек* — для фиксации начала лёта вредного объекта, а также привлечения и отлова самцов.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Брянской области продолжает отслеживать распространение хлопковой совки.

Консультацию по вопросам идентификации, мониторинга и борьбы с вредными объектами можно получить в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Брянской области по телефону (4832) 41-07-37, а также в его районных и межрайонных отделах.