

## СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

## РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА

№ 12 от 03.04.2024 г.



350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, 329  
тел. (861) 224-72-31, e-mail: [otdelzr23@yandex.ru](mailto:otdelzr23@yandex.ru)

### Внесение гербицидов на горохе



На посевах гороха в фазе 3-5 листьев наступили сроки внесения гербицидов. Основными засорителями являются марь белая, горчица полевая, осот розовый, виды щирицы, ромашка, просо куриное и др. Сорняки потребляют значительное количество питательных веществ и влаги, что сильно угнетает посевы гороха и ведет к снижению продуктивности и урожайности культуры.

Выбор гербицидов зависит от видового состава сорной растительности и степени засоренности. Наиболее эффективны обработки в ранние фазы роста сорняков. Также влияет и температурный режим

- необходимо использовать препараты в диапазоне 10 - 20°C.

Горох является чувствительной культурой к применению гербицидов, поэтому для снятия пестицидной нагрузки рекомендуем в смесь добавлять препараты на основе гуминовых кислот.

**Важно!** Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий.

Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.

